

HYFTOR[®]
(sirolimus topical gel) 0.2%

No es una paciente real.
Los resultados individuales pueden variar.



**Antes
de su cita**



Cuestionario de preparación

Las preguntas a continuación pueden servirle para pensar sobre temas que pueden surgir en su próxima cita. Al compartir esta información, usted puede ayudar a su equipo de cuidado médico a recomendar un plan de tratamiento adecuado para usted. Traiga sus respuestas para ayudar a guiar la conversación con su médico.

Nota para padres / tutores legales y cuidadores

Puede ser útil conversar sobre estos temas con su ser querido antes de su cita para que ambos puedan estar preparados.

Preguntas para usted

Respuestas

¿Cómo está su angiofibroma facial? Presentemente, ¿cuál es su experiencia con la afección?

¿Ha cambiado algo desde su última cita? ¿Se ha empeorado o mejorado el angiofibroma facial?

¿Cómo está tratando su angiofibroma facial? ¿Cómo le va el tratamiento? ¿Sigue usando este tratamiento?

¿Está experimentando alguna dificultad con su tratamiento actual? Si es así, ¿qué dificultades?

¿Está experimentando algún efecto secundario?

¿Hay algo más que le impida continuar con su tratamiento?

¿Tiene obstáculos para acceder a su tratamiento actual? ¿Tiene problemas con la cobertura del seguro o cualquier otra cosa?

¿Está interesado o interesada en conocer nuevas opciones de tratamiento?

Importante: HYFTOR[®] es para uso exclusivo externo sobre la piel (tópico). No utilice HYFTOR[®] en la boca, los ojos o la vagina.

No use HYFTOR[®] si tiene alergia a sirolimus o a cualquiera de los demás componentes de HYFTOR[®].

Consulte la información de seguridad importante completa en el reverso y la información para el paciente ubicada en el bolsillo para obtener información de seguridad adicional.

Información importante de seguridad a destacar

¿Qué es HYFTOR[®]?

HYFTOR[®] es un medicamento de venta con receta de uso sobre la piel (tópico) para tratar a adultos o a niños de 6 años en adelante que padecen un tipo de tumor no canceroso llamado angiofibroma facial causado por una afección genética conocida como esclerosis tuberosa.

Se desconoce si HYFTOR[®] es seguro o eficaz en niños menores de 6 años.

HYFTOR[®]
(sirolimus topical gel) 0.2%

No es una paciente real.
Los resultados individuales pueden variar.



**Durante
su cita**

HYFTOR[®] es el primer y único medicamento de venta con receta aprobado por la FDA de uso sobre la piel (tópico) para tratar el angiofibroma facial relacionado con el complejo de esclerosis tuberosa (CET) en adultos y niños de 6 años en adelante. Las siguientes preguntas pueden ayudar a orientar la conversación para ver si HYFTOR[®] es adecuado para usted.

Preguntas para su médico

Respuestas

Supé que hay un nuevo tratamiento tópico para el angiofibroma facial. ¿Qué es HYFTOR[®]?

¿Cuáles son los beneficios de HYFTOR[®]?

¿Cuáles son los riesgos de HYFTOR[®]? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

¿Qué tan eficaz es HYFTOR[®]?

¿HYFTOR[®] sería bueno para mí?

¿Cómo puedo obtener HYFTOR[®]? ¿Está disponible ahora?

¿Mi seguro cubrirá HYFTOR[®]?

Información importante de seguridad a destacar (continuado)

Los efectos secundarios más comunes de HYFTOR[®] incluyen piel reseca, irritación en la zona de aplicación, picor, acné, erupción similar al acné, enrojecimiento de los ojos, hemorragia e irritación cutáneas.

HYFTOR[®] puede causar problemas de fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar su capacidad para tener hijos. Hable con su médico si esto le preocupa.

Consulte la información de seguridad importante completa en el reverso y la información para el paciente ubicada en el bolsillo para obtener información de seguridad adicional.

¿Qué es HYFTOR® (sirolimus topical gel) 0.2%?

HYFTOR® es un medicamento de venta con receta de uso sobre la piel (tópico) para tratar a adultos o a niños de 6 años en adelante que padecen un tipo de tumor no canceroso llamado angiofibroma facial causado por una afección genética conocida como esclerosis tuberosa.

Se desconoce si HYFTOR® es seguro o eficaz en niños menores de 6 años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD CONTRAINDICACIONES

Importante: HYFTOR® es para uso exclusivo externo sobre la piel (tópico). No utilice HYFTOR® en la boca, los ojos o la vagina.

No use HYFTOR® si tiene alergia a sirolimus o a cualquiera de los demás componentes de HYFTOR®.

Antes de usar HYFTOR®, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:

- Tiene una infección cutánea en la zona de tratamiento.
- Tiene niveles altos de colesterol o triglicéridos (grasas o lípidos) en la sangre.
- Tiene programada una inmunización (vacunación). Debe evitar recibir vacunas de virus vivos durante su tratamiento con HYFTOR®. Las vacunas pueden ser menos eficaces durante el tratamiento con HYFTOR®.
- Está embarazada o planifica un embarazo. HYFTOR® puede causar daño al feto. No debe quedar embarazada durante el tratamiento con HYFTOR®.
 - Si existe la posibilidad de embarazo, debe prevenirlo con un método anticonceptivo eficaz antes de comenzar el tratamiento con HYFTOR®, durante el tratamiento, y durante las 12 semanas siguientes a la última dosis de HYFTOR®. Hable con su médico sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante este tiempo.
- Está amamantando o planifica hacerlo. Se desconoce si HYFTOR® pasa a la leche materna. No debe amamantar durante el tratamiento con HYFTOR®.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos con receta y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Qué debo evitar durante mi tratamiento con HYFTOR®?

Restrinja la exposición a la luz del sol y a la luz artificial, como lámparas de bronceado y terapia con luz ultravioleta, durante el tratamiento con HYFTOR®. Use ropa que cubra la piel si necesita salir al aire libre. Hable con su médico sobre otras formas de proteger la piel contra el sol.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HYFTOR®?

HYFTOR® puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- Reacciones alérgicas. Se han producido reacciones alérgicas graves en personas que han tomado sirolimus por vía oral. Deje de usar HYFTOR® y obtenga ayuda médica de inmediato si experimenta alguno de estos síntomas: hinchazón del rostro, los ojos o la boca, dificultad para respirar o sibilancias, opresión en la garganta, dolor u opresión en el pecho, sensación de mareo o desmayo, erupción cutánea o descamación de la piel.
- Infecciones. Se han producido infecciones graves, incluidas infecciones que pueden producirse cuando el sistema inmunitario está debilitado, en personas que han tomado sirolimus por vía oral. Algunas personas han desarrollado una infección cerebral grave y poco frecuente llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), que a veces puede causar la muerte. Deje de usar HYFTOR® y llame a su médico de inmediato si experimenta síntomas de una infección, como fiebre o escalofríos.
- Riesgo de cáncer. Se han producido linfomas y otros tipos de cáncer, especialmente cáncer de piel, en personas que han tomado sirolimus por vía oral. Hable con su médico sobre el riesgo de cáncer que corre si usa HYFTOR®.
- Un aumento en niveles de colesterol y triglicéridos (grasas o lípidos) en la sangre se ha producido en personas que han tomado sirolimus por vía oral. Su médico le tratará los niveles elevados de lípidos, si es necesario.
- Problemas pulmonares o respiratorios. Se han producido problemas pulmonares o respiratorios, incluidos problemas que a veces han causado la muerte, en personas que han tomado sirolimus por vía oral. Deje de usar HYFTOR® y obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas como falta de aliento, tos nueva o que empeora, o dolor en el pecho.

Los efectos secundarios más comunes de HYFTOR® incluyen piel reseca, irritación en la zona de aplicación, picor, acné, erupción similar al acné, enrojecimiento de los ojos, hemorragia e irritación cutáneas.

HYFTOR® puede causar problemas de fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar su capacidad para tener hijos. Hable con su médico si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de HYFTOR®. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Consulte la información de prescripción completa, incluida la información para el paciente en HYFTORPI.com para obtener información de seguridad adicional.